

Patientenkarte zur sicheren Anwendung

XOLREMDI (Mavorixafor)



SCHWANGERSCHAFT UND EMPFÄNGNISVERHÜTUNG

Diese Karte enthält wichtige Informationen zu Xolremdi.

- Nehmen Sie Xolremdi nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein, da es Ihrem ungeborenen Kind schaden kann.

Version 1.0
Stand April 2026

- Wenn Sie schwanger werden können, müssen Sie während der Behandlung mit Xolremdi und für drei Wochen nach der letzten Dosis eine hochzuverlässige Verhütungsmethode (z. B. Doppel-Barrieremethode) anwenden.
- Wenn Sie ein Mann sind und Ihre Partnerin schwanger werden kann, müssen Sie während der Behandlung mit Xolremdi und für drei Wochen nach der letzten Dosis beim Geschlechtsverkehr ein Kondom verwenden.
- Wenn Sie oder Ihre Partnerin vermuten, dass eine Schwangerschaft besteht, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt.

Bitte lesen Sie auch die Packungsbeilage sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen enthält.

Wenn Sie Fragen zu Xolremdi haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.